

## **Kornitol ROT**

Kornitol zastaví černou zvěř, srncí, jelení, zajíce, králíky a ptáky v bezpečné vzdálenosti od užitkových ploch. Kornitol obsahuje různé pachové látky, které se následně vypařují, aniž by zvěři uškodily.

Účinnost Kornitolu trvá cca 4 týdny. Vzhledem k možnosti návyku zvěře na daný pach doporučujeme střídat účinnou repelentní látku např. Kornitol rot za Hukinol, Armacol.

### **Návod k použití:**

K vypařování upevněte Kornitolem nasáklé proužky látky např. na asi 80 cm vysoké kolíky ve vzdálenosti asi 3 - 30 m od sebe kolem chráněné plochy. Cca po 4 týdnech látku opět proveďte aplikaci přípravku. Pro zvýšení účinnosti dejte látkové proužky do proděravělého igelitového sáčku (dlouhodobější vypařování) a zamezte průniku vody dovnitř (vyplavení přípravku). Druhou možností je instalace lahvičky (např. od léků) s menším množstvím koncentrátu a látkového knotu (postupné vypařování). Doporučená vzájemná aplikační vzdálenost: 3 m - 30 m (dle aplikační metody a konfigurace terénu).

### **Zvláštní upozornění:**

Používejte jen podle návodu na použití. Nesprávné použití může způsobit poškození zdraví. Zdraví škodlivé při vnitřním požití. Vyvarujte se potřísnění sliznic a očí. Chraňte před dětmi. Používejte ochranné rukavice, případně potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při požití ihned vyhledejte lékaře a vezměte s sebou obal nebo etiketu. Kornitol neskladujte s krmem nebo potravinami (přenos zápachu a chuti). Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vodních zdrojů. Použití v ochranném vodním pásmu není dovoleno. Kornitol nedávejte přímo na živé rostliny!

### **Likvidace:**

Prázdné obaly a nasycené hadry volně nevyhazujte, ani nezahrabávejte, ale odložte je do nádob na domácí odpad.

### **Složení:**

Přírodní tuky a oleje v synergetické směsi.